


Subkutan injektion i lår

Stikkeskemaer – vejledning til dig der giver subkutan injektion

Fordeling af subkutan injektion i lår: Fra pressefold til sidesøm

- Der kan injiceres fra lysken til en håndsbredde over knæet.
- Der skal minimum være 1cm mellem hvert stik.



Dokumentation af subkutan injektion


- Ved injektion af fx insulin skal det aktuelle stikkeskema være tilgængeligt (det kan findes på VAR).
- Åben medicinmodulet og vælg "Aktuel medicin" og orienter dig i "Andre dispenseringsformer".
- Tjek "Historik" i forhold til hvor der sidst er injiceret insulin. Hvis det fx er "Lår 5", finder du nr. 6 på stikkeskemaet "Fordeling af insulin i lår".
- Vælg præparat, tid og register givet ud for det tidspunkt insulinen skal injiceres. Herefter oprettes et notat på præparatet hvor du beskriver hvor insulinen er injiceret fx "Lår 6".

Subkutan injektion i mave

Stikkeskemaer – vejledning til dig der giver subkutan injektion

Fordeling af subkutan injektion i mave

- Der kan injiceres i hele maveregionen, dog 1,5 cm. Fra navlen
- Der skal minimum være 1cm mellem hvert stik.



Dokumentation af subkutan injektion


- Ved injektion af fx insulin skal det aktuelle stikkeskema være tilgængeligt (det kan findes på VAR).
- Åben medicinmodulet og vælg "Aktuel medicin" og orienter dig i "Andre dispenseringsformer".
- Tjek "Historik" i forhold til hvor der sidst er injiceret insulin. Hvis det fx er "Mave 5", finder du nr. 6 på stikkeskemaet "Fordeling af insulin i mave".
- Vælg præparat, tid og register givet ud for det tidspunkt insulinen skal injiceres. Herefter oprettes et notat på præparatet hvor du beskriver hvor insulinen er injiceret fx "Mave 6".

Subkutan injektion i hofte

Stikkeskemaer – vejledning til dig der giver subkutan injektion

Fordeling af subkutan injektion i hofte

- Der kan injiceres i øverste laterale kvadrat.
- Der skal minimum være 1cm mellem hvert stik.



Dokumentation af subkutan injektion

- Ved injektion af fx insulin skal det aktuelle stikkeskema være tilgængeligt (det kan findes på VAR).
- Åben medicinmodulet og vælg "Aktuel medicin" og orienter dig i "Andre dispenseringsformer".
- Tjek "Historik" i forhold til hvor der sidst er injiceret insulin. Hvis det fx er "Hofte 5", finder du nr. 6 på stikkeskemaet "Fordeling af insulin i hofte".
- Vælg præparat, tid og register givet ud for det tidspunkt insulinen skal injiceres. Herefter oprettes et notat på præparatet hvor du beskriver hvor insulinen er injiceret fx "Hofte 6".